

COVID-19 OLTÁS

FONTOS INFORMÁCIÓK

Szlovákiában az oltás ingyenes. A 18 év feletti embereket oltják.
Az oltással kapcsolatos információt a www.korona.gov.sk weboldalon találja meg.



KI KÉRVÉNYZHETI AZ OLTÁST

Az kérvényezheti, aki az aktuális nyílt szakaszba vagy az előző oltási szakaszba tartozik.



HOL OLTATHATNAK BE

A COVID-19 elleni oltást az oltási központokban végzik, amelyet Szlovák Köztársaság minden járásában létrehozottak.



HÁNYSZOR KELL OLTAKOZNI

A COVID-19 vakcinákat jelenleg két adagban adják be. A vakcina második időpontját automatikusan megkapja. Ha átvészelte a COVID-19 betegséget akkor az elkövetkezendő 90 napon át ellenanyagot kell hogy termeljen a szervezete. Az oltásra csak ezen időszak lejártával jelentkezhet.



REGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS

Tudja meg melyik csoportba tartozik, és melyik fázis van jelenleg nyitva. Ha a csoportja jelenleg nyílt szakaszban van, kérjen oltást a weboldalon www.old.korona.gov.sk

Ki kell tölteni: személyes és elérhetőségi adatokat, címet, csoportot, amelyhez tartozik, preferált hely, hol és mikor akarja beoltatni magát régió vagy város szerint.

Az időpontot a választott napon kapja. Ha az összes hely le van foglalva ill. A kiválasztott központ foglalt, próbálkozzon egy másik nap a regisztrációval.



HOGYAN KELL VISELKEDNI AZ OLTÁS UTÁN

Ha már be van oltva, értesítse erről háziorvosát. Mutassa meg neki vagy küldje el az oltási jelentés másolatát.

Az oltás után 48 órával ajánlott pihenni. Kerülje a fizikai megterhelést és az alkohol fogyasztását.

Az első adag beadása után továbbra is tartsa be a védőintézkedéseket és szigorúan védekezzen a lehetséges fertőzések ellen. Ha komoly okokból nem fog tudni megjelenni a második oltáson, kérvényezze át magát újabb időpontra.



LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Az oltás utáni első 2-3 napban enyhe láza lehet. Ha a hőmérséklete 38 °C felett lesz ez azt jelentheti, hogy COVID-19 vagy más fertőzésben szenved. Lépjen kapcsolatba kezelőorvosával.

Az oltás után bőrvörösség jelentkezhet az injekció beadásának helyén és a nyirokcsomók is megduzzadhatnak.

Fájdalom és láz esetén vegyen be a paracetamol-t tartalmazó gyógyszerek egyikét. pl. Panadol, Paralen stb. (kövesse a betegtájékoztató utasításait), hogy jobban érezze magát.

A tünetek általában kevesebb, mint egy hétig tartanak. Ha a tünetei rosszabbodnak vagy ha aggódik, forduljon orvosához.



MI A TEENDŐ, HA AZ OLTÁSOK KÖZÖTT MEGFERTŐZÖDIK

Ha az első oltás után néhány nappal gyengeséget, fáradtságot, testfájdalmat tapasztal, akkor újra tesztelnie kell. Lehetséges, hogy közvetlenül vagy az oltás előtt, vagy utána koronavírussal fertőzött. Ebben az esetben azonban a fertőzés folyamatának enyhébbnek kell lennie.



MIKOR NEM SZABAD OLTAKOZNI

Ha akút gyulladásos vagy lázas betegségben szenved, az oltás csak a gyógyulás után javasolható. Megfázás esetén, hőemelkedés nélkül az oltás nem akadály.

Ha allergiás a vakcina bármely összetevőjére, előzetesen forduljon orvosához.

Ha az oltás első adagját követően rendkívül erős allergiás reakció alakul ki önnél, azonnal forduljon orvosához.



AZ OLTÁST AZ ORVOSOK BELÁTÁSÁRA BÍZZA

Ha vérhígító gyógyszereket szed akkor vértlemezkeszám csökkennésében szenved vagy véralvadási rendellenessége van, minden esetben konzultálja orvosával.

Ha Ön különösen érzékeny csoportba tartozik, az egészségi állapota rendkívül súlyos a szervezete nem tud védekezni az oltás ellen.